

6%患者出现局部灼痛、不适感或瘙痒。口服药物的主要不良反应为胃肠道反应(恶心和下腹部不适)和头痛。口服氟康唑的胃肠道反应发生率为5%~12.5%;口服伊曲康唑的胃肠道反应发生率<6%;口服酮康唑的胃肠道反应发生率为10%。此外,口服咪唑类抗真菌药患者偶见肝酶升高,服用酮康唑的患者可能出现肝毒性,有个别死亡报道。

2.4 中华妇产科学会“外阴阴道念珠菌病诊治标准”(暂行)中VVC的治疗方案

2.4.1 单纯性VVC 根据美国CDC 2002年Guideline的建议,单纯性VVC是指本次发病为初次或非初次而偶发的,其症状和体征总评分为轻度或中度,病原体为常见的白色念珠菌,患者为正常健康非孕宿主。

首选阴道局部用药,方案:阴道用药①硝酸咪康唑:咪康唑栓400mg, qn, 共3d;或咪康唑栓200mg, qn, 共7d。②克霉唑:克霉唑栓100mg, qn, 共7d;或克霉唑栓500mg, 单次用。③制霉菌素:制霉菌素栓10万U, qn, 共14d。口服用药方案:①伊曲康唑:口服, 每次200mg, bid, 共1d。②氟康唑:150mg, 顿服, 共1次。

2.4.2 RVVC 是指妇女患VVC后,经过抗真菌治疗临床症状和体征消失,真菌学检查阴性,其后又再次出现症状和体征,真菌学检查又呈阳性,一年

内复发4次或4次以上。复发率比较高,为5%~15%。RVVC须强化治疗和巩固治疗。

强化治疗:口服用药:①伊曲康唑200mg, bid, 共2d。②氟康唑150mg, 3d后重复一次。阴道用药:①硝酸咪康唑:咪康唑栓400mg, qn, 共7d;咪康唑栓200mg, qn, 共14d。②克霉唑:克霉唑栓100mg, qn, 共14d。

巩固治疗:口服用药:①伊曲康唑200mg, bid, 每月1d, 共6个月。②氟康唑150mg, 顿服, 每月1次, 共6个月。局部用药:①咪康唑栓400mg, qd, 每月3d, 共6个月。②克霉唑栓500mg, 每周1次, 共6个月。

2.4.3 严重性VVC 口服用药:①伊曲康唑200mg, bid, 共2d。②氟康唑150mg, 顿服, 3d后重复1次。局部用药:①咪康唑栓400mg, qn, 共3d;或咪康唑栓200mg, qn, 共7d。②克霉唑栓100mg, qn, 共7d。

2.4.4 妊娠期VVC 妊娠期VVC治疗效果不如非孕期。禁止使用口服抗真菌药物,建议选择长疗程局部治疗方案。局部用药:①硝酸咪康唑:咪康唑栓400mg, qn, 共3d;或咪康唑栓200mg, qn, 共7d。②克霉唑栓100mg, qn, 共7d。③制霉菌素栓10万U, qn, 共14d。

· 加油站 ·

氟康唑别名及商品名

商品名	生产厂家	商品名	生产厂家
三维康(胶囊)	上海三维制药	悦来(片)	河南医保药业
大扶康(注射剂、胶囊)	法国辉瑞制药	康锐(片)	江苏扬子江药业
赛浦氟康(胶囊)	塞浦路斯麦道甘美药厂	康翔(注射剂)	中日合资大连光彩制药
氟康力(注射剂)	广州南新制药	大扶康(胶囊、注射剂)	大连辉瑞制药
维可衡(注射剂)	江西制药	莱抗(片)	浙江奥托康药业
博泰(片)	河南东方制药	帅克风(片、胶囊)	河南帅克药业
依利康(片、注射剂)	石家庄四药	莱普罗康(注射剂)	德阳华康药业
麦尼芬(胶囊)	杭州民生制药	喜欣舒(注射剂)	山东华鲁制药
福康力(注射剂)	广州南新制药	乾意(注射剂)	山东潍坊制药厂
仟德(注射剂)	安徽环球药业	氟强(注射剂)	江苏济川制药
普芬(滴眼剂)	沈阳兴齐制药	易启扶(注射剂)	成都倍特药业
昊康(片)	河南东方制药厂	华士欣(葡萄糖)(注射剂)	山东华鲁制药
静达(滴眼剂)	山东正大福瑞达制药		
均青(片)	天津药业		

别名:呋康唑、博康、氟锐、氟迪、三河、辰景、艾美仕、Deflucan、Syncon、UK-49858