

现黄疸。

临床试验中,兰索拉唑和阿莫西林以及克拉霉素合用或者兰索拉唑与阿莫西林合用,与单独用药相比,未发现特殊的生化指标的改变。

5.13 过量用药

大鼠和小鼠口服剂量至 1 500mg/kg(分别为按照人体表面积推算剂量的 1 300 倍和 675.7 倍),无死亡和相关临床症状。

兰索拉唑无法通过血透去除。有报道一例患者服用 600mg 兰索拉唑未出现不良反应。

6 剂量和用法

6.1 十二指肠溃疡

推荐成人口服 15mg/次,1 次/d,连续服用 4 周。

6.2 根除 Hp 以减少十二指肠溃疡的风险

6.2.1 三联疗法:兰索拉唑/阿莫西林/克拉霉素  
推荐成人口服剂量:30 mg 兰索拉唑,1g 阿莫西林,500 mg 克拉霉素,均 2 次/d(12h 间隔给药),服用 14d。

6.2.2 二联疗法:兰索拉唑/阿莫西林 推荐成人口服剂量:30 mg 兰索拉唑,1g 阿莫西林,3 次/d(间隔 8 小时给药),服用 14d。

对于老年人和肾功能不全的患者需要参考阿莫西林和克拉霉素的禁忌证和用药注意事项。

6.3 十二指肠溃疡治愈患者的维持治疗

推荐成人剂量为 15mg/次,1 次/d。

6.4 胃溃疡

推荐成人剂量为 30 mg/1 次/d,连续服用 8 周以上。

6.5 糜烂性食管炎

推荐成人剂量为 30 mg/1 次/d,连续服用 8 周。未治愈的患者(约占 5% ~ 10%)可以加服 8 周。对于复发的糜烂性食管炎患者也可再服用 8 周。

6.6 糜烂性食管炎的维持治疗

推荐成人剂量 15 mg/1 次/d。

6.7 病理性的高酸分泌状态,包括 Zollinger - Ellison 综合征

需要根据患者的分泌状态进行个性化用药。推荐成人起始口服剂量 60mg/1 次/d。需要根据患者的实际情况调整用量并且持续至临床症状缓解。有报道用量达 90mg/2 次/d。若每日服用量超过 120mg,需要分次服用。有一些 Zollinger - Ellison 综合征患者持续服用兰索拉唑达 4 年之久。

对于肾功能不全患者和老年患者不需调整用量。有严重肝脏疾病的患者需要调整用量。

兰索拉唑缓释制剂需在饭前服用。

(军事医学科学院毒物药物研究所 孙建绪  
摘译自 PDR 第 52 版 王文刚 校)

· 加油站 ·

奥美拉唑别名及商品名

商品名	生产厂家
洛赛克(注射剂、胶囊、片)	阿斯特拉
奥克(胶囊、注射剂)	常州四药
康奥(胶囊)	湖南康普制药
奥斯坦(胶囊)	广东汕头制药
奥巴唑(胶囊)	大西洋制药
澳美拉唑(肠溶片)	山东鲁南制药
得欣(胶囊)	海口海灵制药
金洛克(胶囊)	韩国钟根堂制药
奥赛康(胶囊)	江苏扬州制药
爱尼(肠溶片)	山西亚宝药业
福尔丁奥美拉唑(胶囊)	佛山康宝顺药业
彼司克(胶囊)	广东开平彼迪药业
金奥康(胶囊)	浙江金华康恩贝生物制药
洛美克(胶囊)	印度悉普拉药厂
海美拉(胶囊)	海口海灵药厂
洛凯(注射剂)	苏州第六制药
康普(胶囊)	海南康普制药

商品名	生产厂家
克迪圣(胶囊)	山东淄博万杰制药
绅丽雨(肠溶片)	北京大洋药业
奥西康(肠溶片、注射剂)	南京奥赛康药业
洛赛克 MUPS(胶囊)	瑞典阿斯利康药厂
奥美(肠溶片)	山东鲁南制药
绅丽丽(片)	太泽药业
奥西康(肠溶片)	江苏联环药业
洛镁赛(镁)(肠溶片)	河南奥森制药
双鲸吉立(肠溶片)	青岛双鲸药业
斯胃宁(胶囊)	云南通用善美制药
延风(胶囊)	东北制药沈阳市延风制药

[别名] 沃必唑、渥米哌唑、亚砒咪唑、欧麦亚砒、艾斯特、安胃哌唑、甲氧磺唑、卫全、Lomac、Mopral

(赵志刚供稿)